

Reddod





Popper



Il popper o nitrato di amile è un medicamento solitamente usato per il trattamento dell'angina pectoris e viene assunto per l'effetto afrodisiaco.

È una sostanza liquida.

Viene inalato per lo più dalla bottiglia che lo contiene.

Gli effetti

Distensione muscolare, abbassamento della pressione sanguigna, aumento della frequenza cardiaca, vampate di calore, insensibilità al dolore, euforia e intensificazione dell'orgasmo.

La durata degli effetti è pari a 1-2 minuti.

Rischi ed effetti collaterali

Mal di testa, vertigini, palpitazioni, perdita di conoscenza, collasso del sistema circolatorio per un abbassamento della pressione.

I rischi a lungo termine si verificano in caso di consumo regolare e sono problemi permanenti delle facoltà mnemoniche e della concentrazione, problemi legati alla reattività, problemi cardiaci, epatici, renali e del sistema nervoso centrale.

Safer use

- Non consumare mai il popper se sei da solo
- Non prendere dosi eccessive perché rischi il collasso delle funzioni circolatorie
- Evita il policonsumo
- Il popper associato al viagra può portare all'arresto cardiaco
- Le persone affette da malattie circolatorie, cardiache, i soggetti epilettici e le donne gravide devono astenersi dal consumo di popper
- Bere popper può causare delle gravi ustioni interne

